

哌喹〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_93_8C_E5_96_B9_E3_80_94_E5_c22_309592.htm 药品名称哌喹〔典〕
药物别名（磷酸哌喹，抗矽-14，13228R.P.）英文名
称Piperaquine 类别主要用于控制疟疾症状的抗疟药性状常用
其磷酸盐，为类白色至淡黄色的结晶性粉末；无臭，味微苦
，遇光易变色。在水中微溶，在无乙醇或氯仿中几乎不溶
。制剂片剂：每片含磷酸哌喹250mg。分子式成分药理及应用本
品的抗疟作用与氯喹相类似。口服吸收后贮存于肝脏，以后
缓慢释放进入血液，故作用持久。主要用于疟疾症状的抑制
性预防，也可用于疟疾的治疗。此外并有延缓矽肺病情进展
的作用，现正试用于矽肺的防治。用法用量（1）疟疾症状抑
制性预防，每月服磷酸哌喹0.75～1g一次，睡前服，可连服3
～4个月，但不宜超过6个月。（2）控制疟疾症状，本药对于
抗氯喹性恶性疟有根治作用，但作用缓慢，宜在奎宁，青蒿
素类或咯萘啶控制症状后续用本品。首剂服磷酸哌喹1g，8
～12小时以后服0.5～1g。（3）矽肺的防治 预防，每次
服500mg，10～15日1次，1月量1000～1500mg；治疗，每
次500～750mg，每周1次，1月量2000mg。以半年为1疗程，间
歇1月后，进行第2疗程，总疗程约3～5年。注重事项服药后
偶有头昏、嗜睡、乏力、胃部不适、面部和嘴麻木感，轻者
一般休息后能自愈。肝功能不全及孕妇慎用 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com