

复方盐酸伪麻黄碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E7_9B_90_E9_c22_309594.htm

药品名称复方盐酸伪麻黄碱药物别名新康泰克、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 英文名称Compound Pseudoephedrine HCl Sustained Release 类别解热镇痛药制剂胶囊：盐酸伪麻黄碱0.09g，马来酸氯苯那敏0.004g。

分子式成分盐酸伪麻黄碱、马来酸氯苯那敏 药理毒理本品为缓解感冒症状的复方制剂。其中盐酸伪麻黄碱为拟肾上腺素药，具有收缩上呼吸道毛细血管，消除鼻咽部粘膜充血，减轻鼻塞症状的作用；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能进一步减轻感冒引起的鼻塞、流涕等症状。本品内容物中既含有速释小丸，也含有能在一定时间内发挥作用的缓释小丸，其有效浓度可维持12小时。适应症本品可减轻由于普通感冒及流行性感冒引起的上呼吸道症状和鼻窦炎，枯草热所致的各种症状，非凡适用于缓解上述疾病的早期临床症状，如打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等。不良反应倦、口干、胃部不适、乏力、头晕、大便干燥等。相互作用1.本品不宜与氯霉素、巴比妥类、解痉药、酚妥拉明、洋地黄苷类并用。2.如正在服用其它药品，使用本品前请向医师咨询。用法用量口服，成人每12小时服1粒，24小时内不应超过2粒。注重事项1.本品一日剂量不得超过2粒，疗程不超过3~7天。症状未改善者请咨询医师。2.服用本品期间禁止饮酒。3.不能同时服用含有与本品成分相似的其它抗感冒药。4.驾驶机动车，操作机器以及高空作业者工作时间禁用。5.肝、肾功能不全者慎用。6.当本品性状发生改变时禁用。7.请将本品放在儿童不

能接触的地方。孕妇及哺乳期妇女慎用。儿童用量请咨询医师或药师。老年心脏病、高血压、甲状腺疾病、糖尿病、前列腺肥大等患者使用本品前请咨询医师。药物相互作用：1. 本品不宜与氯霉素、巴比妥类、解痉药、酚妥拉明、洋地黄苷类并用。2.如正在服用其它药品，使用本品前请向医师咨询。禁忌症：对本品中任一组分过敏者禁用。药物过量：勿过量服药，如过量服药或有严重反应时请立即去医院就医。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com