

贝诺酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E8_B4_9D_E8_AF_BA_E9_85_AF_c22_309613.htm 药品名称贝诺酯药物别名扑炎痛，对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯，Benasprate

，Benorylate，BENORAL 英文名称Benori 类别解热镇痛药性状白色结晶或结晶性粉末；无臭，无味。在沸乙醇中易溶，在沸甲醇中溶解，在甲醇或乙醇中微溶，在水中不溶。分子式成分药理及应用为对乙酰氨基酚与阿司匹林的酯化产物，是一新型抗炎、解热、镇痛药。口服后于肠内吸收， $t_{1/2}$ 约1小时，肝中代谢。特点是很少引起胃肠出血。主用于类风湿性关节炎、急慢性风湿性关节炎、风湿痛、感冒发烧、头痛、神经痛及术后疼痛等。用法用量类风湿，风湿性关节炎：口服每次4g，每日早晚各1次；或每次2g，1日3~4次。一般解热、镇痛：1次0.5~1.5g，1日1.5~4.5g。儿童：3月~1岁，25mg/kg，1日4次；1~2岁每次250mg，1日4次；3~5岁，每次500mg，1日3次；6~12岁，每次500mg，1日4次。幼年类风湿性关节炎，每次1g，1日3~4次。注重事项（1）可引起呕吐、烧心、便秘、嗜睡及头晕等。用量过大可致耳鸣、耳聋。（2）肝、肾功能不全，阿司匹林过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com