

安乃近 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_AE_89_E4_B9_83_E8_BF_91_c22_309616.htm 药品名称安乃近药物别名诺瓦经，罗瓦尔精，Analgin，Noramidopyrine

，NOVALGIN 英文名称Metamizole Sodium 类别解热镇痛药性状白色（供注射用）或略带微黄色（供口服用）结晶性粉末；无臭，味微苦；水溶液放置后渐变黄色。在水中易溶，在乙醇中略溶，在乙醚中几乎不溶。分子式成分本品为氨基比林与亚硫酸钠的加成物。药理及应用解热作用显著，镇痛作用较强，作用出现快。主要用于退热，亦用于急性关节炎、头痛、风湿性痛、牙痛及肌肉痛等。用法用量口服：一次0.25~0.5g，一日0.75~1.25g。滴鼻：小儿退热常以10%~20%溶液滴鼻，5岁以下，每次每侧鼻孔1~2滴，必要时重复用1次；5岁以上适当加量。深部肌肉注射：每次0.25~0.5g；小儿每次5~10mg/kg。注重事项（1）本品较易引起不良反应，尤不宜用穴位注射，非凡禁用关节部位穴位。（2）对药物过敏者（如对吡唑酮类药物）不宜用，不得与任何其它药物混合注射。（3）注射局部可产生红肿、疼痛，数天后可消退。有的病人呈毒血症症状，皮下出血点，或有紫黑色脓液，常需数月后痊愈。（4）较长时间使用可引起粒细胞减少，血小板减少性紫癜，严重者可有再生障碍性贫血甚导致死亡者。

（5）可出现过敏性皮疹或药热、荨麻疹、严重者可有剥脱性皮炎、大疱性表皮松懈症导致死亡。（6）应严格控制剂量，成人每次不得超过0.5g，小儿每次以8~10mg/kg为宜。个别病人由于对本品过敏，可产生休克甚至忽然死亡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

