

头孢噻啉〔 〕（先锋 Ⅲ）PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_99\\_BB\\_E5\\_c22\\_309619.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_99_BB_E5_c22_309619.htm) 药品名称头孢噻啉〔 〕（先锋 Ⅲ）药物别名先锋霉素 Ⅲ、头孢利素、头孢茈萜利定、头孢菌素 Ⅲ、西孢茈里丁、先锋芦里丁、吡噻孢霉素 Cefporin, Keflodin 英文名称Cefaloridine 类别三代头孢制剂每瓶：0.5g 药理毒理基本与头孢噻吩相似，但对革兰阳性菌的作用较前者强，对大肠杆菌的作用亦较强。药动学注射后血中浓度较头孢噻吩高，排泄亦较慢。适应症用于敏感菌所致的呼吸道感染、皮肤和软组织感染、泌尿道感染、胆道感染、胸腔腹腔感染，也可用于脑膜炎、败血症、胸膜炎。不良反应1与头孢噻吩相似，但肾毒性较明显，其对肾脏损害与用药剂量相平行，一般成人每日不超过4g。肾功能减退者适当减量。2 偶有丙氨酸氨基转移酶升高、白细胞减少及变态反应。用法用量成人，肌注1g～3g/日，分3～4次；静注或静滴2g～4g/日；鞘内50mg/次，1日或隔日1次。儿童，肌注每日30mg～60mg/kg，分3～4次；静注或静滴每日50mg～100mg/kg。注重事项本品引起肾功能损害较多见，不宜与氨基甙类抗生素联用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)