

布洛伪麻胶囊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_B8_83_E6_B4_9B_E4_BC_AA_E9_c22_309631.htm 药品名称布洛伪麻胶囊
药物别名芬世达、得尔 英文名称Ibuprofen and Pseudoephedrine Capsules 类别解热镇痛药制剂每粒含布洛芬200mg，盐酸伪麻黄碱30mg。药理毒理本品所含布洛芬为一有效的解热镇痛及抗炎、抗风湿药物，通过抑制花生四烯酸代谢中的环氧化酶、减少PG的合成而呈现与阿斯匹林相似的作用。所含盐酸伪麻黄碱属于肾上腺受体激动剂，可收缩血管，缓解鼻粘膜充血。适应症由感冒、过敏性鼻炎引起的头痛、发烧、咽喉肿痛、周身关节及四肢肌肉酸痛、鼻塞、流涕、打喷嚏等症状。不良反应本品可引起胃部不适、恶心、呕吐、食欲不振、口干、心悸、眩晕等不良反应，一般症状较轻，停药后消失。用法用量口服，成人一次一粒，一日三次。或遵医嘱。注重事项对布洛芬及 / 或伪麻黄碱过敏者禁用；因服用阿斯匹林和其它非甾体类抗炎药诱发血管性水肿，哮喘或鼻息肉患者及活动期消化道溃疡患者禁用。1. 对麻黄碱药理作用敏感者、有消化道溃疡病史者。心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、糖尿病、青光眼、肺气肿等引起的呼吸困难、前列腺肥大伴排尿困难患者、孕妇、哺乳期妇女及老年人慎用。2. 避免与降压药或抗抑郁药同时服用，服药期间避免饮酒。3. 服用本品若症状未改善或伴高热，应及时停药。4. 本品每日总量不得超过6片，疗程不得超过7天。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com