

双氢青蒿素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_8C\\_E6\\_B0\\_A2\\_E9\\_9D\\_92\\_E8\\_c22\\_309639.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_A2_E9_9D_92_E8_c22_309639.htm) 药品名称双氢青蒿素  
英文名称Dihydroartemisinin 类别主要用于控制疟疾症状的抗疟药制剂片剂，每片20mg。药理及应用本品对疟原虫无性体有强的杀灭作用，能迅速控制症状和杀灭疟原虫。对抗氯喹和哌喹的恶性疟同样具有疗效。本品毒性较低，在动物生殖毒性方面的研究证实，小鼠妊娠感应期给药，增加吸收胎的发生，未见致畸作用。口服吸收良好，起效迅速。人口服双氢青蒿素2mg / kg后t<sub>max</sub>为1.33小时，C<sub>max</sub>为0.71 μg / ml；血浆t<sub>1/2</sub>为1.57小时。本品体内过程的特点是吸收快，分布广、排泄和代谢迅速。可用于各类疟疾。尤其适用于抗氯喹和哌喹的恶性疟和凶险型脑型疟疾的救治。用法用量口服，1日1次，成人1日60mg，首剂量加倍；儿童按年龄递减；连用5~7日。注重事项（1）孕妇慎用。（2）少数病例有轻度网织红细胞一过性减少。未见其它明显不良反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)