

阿司匹林赖氨酸盐 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E9_98_BF_E5_8F_B8_E5_8C_B9_E6_c22_309640.htm 药品名称阿司匹林赖氨酸盐 药物别名赖氨匹林，dl-lysine-acetylsalicylate，ASPEGIC，Venopirin，Aspisol 英文名称Aspirin DL ly 类别解热镇痛药 性状白色结晶或结晶性粉末，无臭，味微苦，遇湿、热及光不稳定。易溶于水，溶于乙醇等有机溶媒。水溶液pH为5~6。制剂注射用阿司匹林赖氨酸盐：每瓶0.9g（相当阿司匹林0.5g）；0.5g（相当阿司匹林0.28g）。药理及应用为阿司匹林和赖氨酸的复盐，作用同阿司匹林，其特点是适于肌注或静注，血浓度高、副作用小。肌注后血药浓度可维持36~120分钟；静注后血浆浓度约为口服的1.8倍。主要用于治疗多种原因引起的发热和疼痛，疗效较好，如上呼吸道感染引起的发热、手术后痛、癌性疼痛、风湿病、关节痛及神经痛等。贮存密封、阴凉干燥处避光保存。用法用量肌注或静注：每次0.9~1.8g，每日2次。儿童1日10~25mg/kg。以4ml注射用水或0.9%氯化钠注射液溶解后注射。注重事项偶有稍微胃肠反应（如胃部不适、恶心、呕吐）及出汗等。对阿司匹林过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com