

青蒿琥酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E9_9D_92_E8_92_BF_E7_90_A5_E9_c22_309647.htm 药品名称青蒿琥酯 英文名称Artesunate 类别主要用于控制疟疾症状的抗疟药性状本品为白色结晶性粉末，室温2~3年保持稳定。制剂片剂：每片50mg；注射用青蒿琥酯：每支60mg。药理及应用对疟原虫无性体有较强的杀灭作用，奏效快，能迅速控制疟疾发作，但对恶性疟配子体无效。静脉注射后血药浓度迅速下降，血浆 $t_{1/2}$ 为30分钟左右；体内分布广泛，以肠、肝、肾中含量较高；本品主要通过代谢转化，尿及粪便排泄仅占少量。主要适用于脑型疟疾及各种危重疟疾的抢救。用法用量口服：每次0.1g，1日1次，首剂量加倍，连服5天。静注：临用前用所附的5%碳酸氢钠注射液溶解后，加5%葡萄糖注射液或葡萄糖氯化钠注射液5.4ml，使每ml溶液含青蒿琥酯10mg，缓慢静脉注射。每次60mg（或1.2mg/kg），7岁以下小儿1.5mg/kg。首次剂量注射后4，24，48小时各重复注射1次，极度严重者，首剂量可加倍。注重事项（1）推荐剂量下未见不良反应，如使用过量（大于3.75mg/kg）可能出现外周网织细胞一过性降低。（2）症状控制后，宜再用其它抗疟药根治。（3）动物毒理实验证实本品有胚胎毒作用，故妊娠早期妇女慎用。（4）本品溶解后应及时注射，如出现混浊则不可使用。静脉注射速度为每分钟3~4ml。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com