

替门汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_9B_BF_E9_97_A8_E6_B1_80_c22_309671.htm 药品名称替门汀药物别名替卡西林钠克拉维酸钾，泰门汀 Ticarcillin SodiumPotassium Clavulanate 英文名称Timentin 类别 - 内酰胺酶抑制剂药理毒理本品对革兰阳性、阴性菌及厌氧菌均具广谱杀菌活性。抗菌谱包括大肠杆菌、变形杆菌、流感嗜血杆菌、克雷白杆菌、肠杆菌、葡萄球菌(包括金葡菌)、淋球菌、军团菌及脆弱拟杆菌等的产酶杆菌、葡萄球菌(包括金葡菌)、淋球菌、军团菌及脆弱拟杆菌等的产酶或不产酶菌。适应症呼吸道感染、尿路感染、骨和关节感染、皮肤和软组织感染、腹膜炎及败血症等。用法用量剂量(以二者总量计)，静注，成人3.2g/次，1次/6~8小时。儿童每次80mg/kg，1次/6~8小时。可溶于注射用水、生理盐水或5%葡萄糖液中缓慢静注或稀释后静滴，于30分钟内滴完。注重事项1 对青霉素过敏者禁用。2 本品不可与碳酸氢钠液合用，亦不可与血液制品，水解蛋白或脂肪乳混合应用，均有配伍禁忌。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com