

甲苯磺酸舒他西林胶囊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_B2\\_E](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_94_B2_E)

8\_8B\_AF\_E7\_A3\_BA\_E9\_c22\_309682.htm 药品名称 甲苯磺酸舒他西林胶囊 药物别名 安特先 类别 - 内酰胺酶抑制剂制剂 187.5mg。药理毒理 本品为氨苄青霉素和舒巴坦的混合制剂，重量（效价）比为2：1。口服制剂比为1：1。以甲烯基相结合，形成双酯结构化合物。由于舒巴坦为一不可逆性β-内酰胺酶抑制剂，因而与氨苄青霉素组成复合制剂时，能有效地保护该抗生素不被水解，维持其原有的抗菌活性。一些对氨苄青霉素耐药的病菌如葡萄球菌属、流行性感嗜血杆菌、淋球菌、脆弱类杆菌及某些肠杆菌属菌株，由于氨苄青霉素与舒巴坦合用后，又再次恢复了对氨苄青霉素的敏感性。适应症 鼻窦炎、中耳炎、支气管炎、细菌性肺炎等上、下呼吸道感染 不良反应 偶有皮疹，胃肠道反应等。禁忌症：对青霉素类药物过敏者禁用。用法用量 口服，对成人（包括老年人）推荐剂量3~6粒，天天二次。体重30公斤以上（包括30公斤）的儿童，按常按成人剂给药。疗程：5~14天。任何由溶血性链球菌引起的感染，疗程最少10天，以防止急性风湿热或肾小球肾炎发生。治疗淋病：单次口服本品2.25g，加服1克丙磺舒，以延长氨苄西林及舒巴坦血清浓度。 注重事项 1、对头孢菌素类药物过敏者禁用。 2、用药期间，若有过敏反应产生，则应停药，并采取相应措施。 3、孕妇及哺乳期妇女应慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)