

盐酸左氧氟沙星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_B7\\_A6\\_E6\\_c22\\_309687.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_B7_A6_E6_c22_309687.htm)

药品名称盐酸左氧氟沙星  
药物别名可乐必妥、左氟沙星、左旋氧氟沙星、乐朗  
Cravid 英文名称Levofloxacin 类别喹诺酮类制剂片剂100mg/片；注射剂200mg  
药理毒理本品为氧氟沙星的左旋体，对于包括厌氧菌在内的革兰阳性菌和阴性菌具广谱抗菌作用。对葡萄球菌属、肺炎球菌、化脓性链球菌、溶血性链球菌、肠球菌属、大肠杆菌、克雷白杆菌属、沙雷杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌及淋球菌等具有很强的抗菌活性。适应症氧氟沙星的左旋体，其抗菌活性比右旋体高。用于呼吸道、泌尿道感染、外科及妇科感染如咽喉炎、支气管炎、扁桃体炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、中耳炎、烧伤及细菌性菌痢疾等。不良反应偶见纳差，恶心、呕吐、腹泻、失眠、头晕、头痛、皮疹及血清谷丙转氨酶升高及注射局部刺激症状等，一般均能耐受，疗程结束后即可消失。相互作用本品与含镁或铝之抗酸剂、硫酸铝、金属阳离子（如铁）、含锌的多种维生素制剂等药物同时使用时将干扰胃肠道对本品的吸收，使该药在各系统内的浓度明显降低。因而，服用上述药物的时间应该在使用本品前或后至少2小时。避免与茶碱同时使用。如需同时应用，应监测茶碱的血药浓度，据以调整剂量。与华法令或其衍生物同时应用时，应监测凝血酶原时间或其他凝血试验。与非甾体类消炎药物同时应用，有引发抽搐的可能。与口服降血糖药同时使用时可能引起血糖失调，包括高血糖及低血糖，因此用药过程中应

注重监测血糖浓度，一旦发生低血糖时应立即停用本品。用法用量片剂成人口服，0.1g~0.2g/次，2~3次/日。注射液：成人剂量一般200mg~400mg/日，稀释后，分二次静脉滴注或遵医嘱。注重事项对喹诺酮类药物过敏者，妊娠、哺乳期妇女、儿童及癫痫患者禁用。1、肾功能不全应减量或慎用。2、神经系统疾患者慎用。3、避免与茶碱同时使用。如需同时应用，应监测茶碱的血药浓度以调整其剂量。4、与华法令或其衍生物同时应用，应监测凝血酶原时间或其它凝血试验。5、性病患者治疗时，应进行梅毒血清学检查，以免耽误对梅毒的治疗。6、本品200mg用不低于250ml的液体稀释，静脉缓慢滴注，滴速过快易引起静脉刺激症状或中枢神经系统反应。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)