

祺尔百服宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A5\\_BA\\_E5\\_B0\\_94\\_E7\\_99\\_BE\\_E6\\_c22\\_309722.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_A5_BA_E5_B0_94_E7_99_BE_E6_c22_309722.htm)

药品名称祺尔百服宁

药物别名祺尔百服宁 英文名称Childrens Bufferin Cold & Cough

Relief Liquid 类别解热镇痛药制剂口服液：60mL。每5mL 对乙

酰氨基酚 acetaminophen 160 mg，盐酸伪麻黄碱

pseudoephedrine HCl 15 mg，氢溴酸右美沙芬

dextromethorphan HBr 5 mg，马来酸氯苯那敏 chlorpheniramine

maleate 1 mg。分子式成分对乙酰氨基酚(acetaminophen)、盐

酸伪麻黄碱(pseudoephedrine HCl)、氢溴酸右美沙

芬(dextromethorphan HBr)、马来酸氯苯那敏(chlorpheniramine

maleate)。适应症儿童因感冒、其它上呼吸道过敏性疾病及花

粉症引起的鼻塞、流涕、鼻粘膜充血水肿、喷嚏、咳嗽、咽

喉肿痛、发热、头痛及周身不适。不良反应偶见口干、胃部

不适、皮疹、轻度嗜睡。用法用量6-11岁儿童(22-43.9 kg)

10 mL/次，2~5岁儿童(11-21.9 kg) 5 mL/次，每4-6 hr口服1

次，每24 hr不超过4次。用药不超过7日。注重事项伴有高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺疾病、青光眼、哮喘伴多痰者

及对非甾体类抗炎药过敏者慎用。用于发热勿超过3日。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)

[www.100test.com](http://www.100test.com)