

散利痛片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_95_A3_E5_88_A9_E7_97_9B_E7_c22_309732.htm 药品名称散利痛片 药物别名对乙酰氨基酚 Paracetamo 类别解热镇痛药制剂每片含对乙酰氨基酚0.25g、异丙安替比林0.15g、咖啡因.05g。药理毒理解热镇痛药。药动学口服吸收迅速而完全，血浆蛋白结合率25%~50%。在肝脏代谢，主要与葡萄糖醛酸及硫酸结合从尿中排泄。肝药酶可使本品产生少量羟化代谢产物，在正常情况下可与肝内谷胱甘肽结合而解毒。T_{1/2} 一般为1h~4h，肾功能不全时不变，但在某些肝脏疾病者、老人及新生儿可延长，小儿则有所缩短。可通过胎盘，经乳汁分泌。适应症感冒引起的发热、关节痛、神经痛、头痛以及偏头痛、痛经等轻至中度疼痛，尤其适用于对阿司匹林过敏或不适于用阿司匹林者（如水痘、血友病、出血性疾病、抗凝治疗的病人以及消化性溃疡、胃炎患者等）。不良反应可发生高铁血红蛋白血症、过敏性皮炎、粒细胞缺乏症、血小板减少症及肝炎等。剂量过大时可引起肝功能损害，严重者可致昏迷甚至死亡，亦可引起肾绞痛和急性肾功能衰竭。相互作用可延长氯霉素的半衰期，甲氧氯普胺可增加本品的口服吸收速率，苯巴比妥可加速本品消除。用法用量成人单剂量1-2片，24 hr内可服3次，6岁以上儿童单剂量1片，24 hr内可服3次。注重事项妊娠B类。肝、肾功能不全患者及孕妇慎用。大量或长期用药应定期作造血功能及肝功能检查。中毒时可用乙酰半胱氨酸解毒，开始口服按体重140mg/kg，然后以70mg/kg每4h服1次，共用17次，病情严重时可静脉给药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

