

新灭菌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_B0\\_E7\\_81\\_AD\\_E8\\_8F\\_8C\\_c22\\_309742.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_96_B0_E7_81_AD_E8_8F_8C_c22_309742.htm) 药品名称新灭菌药物别名

氟氯西林 Flucloxacillin 英文名称Biflocin 类别其他类制剂粉针

剂：1g(含氟氯西林钠、阿莫西林钠各500mg)。分子式成分氟

氯西林钠、阿莫西林钠药理毒理新灭菌是由阿莫西林和氟氯西林按1：1的比例组成的复合抗生素。氟氯西林主要杀灭产

-内酰胺酶金黄色葡萄球菌和其它革兰阳性菌，而阿莫西林则对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有高效杀菌作用。由于氟氯西林抑制

-内酰胺酶，可帮助阿莫西林杀灭其它耐药的革兰

阴性和阳性菌。二者结合增强了杀菌力，扩大了抗菌谱。本品的抗菌谱包括革兰阳性菌：耐药金黄色葡萄球菌、溶血性

链球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌、破伤风杆菌、梭状芽

胞杆菌属、炭疽杆菌、李斯德菌属、肠球菌；革兰阴性菌：

淋球菌、伤寒杆菌、卡他莫拉菌、流行性感嗜血杆菌、百日咳杆菌、大肠杆菌、宋内志贺菌、沙门菌属、奇异变形杆

菌、钩端螺旋体。药动学口服0.5g氟氯西林1h后，血药峰浓度

为23.8mg / L；口服0.25g阿莫西林1~2h后，血药峰浓度

为5mg / L。不良反应用于敏感菌所致呼吸道、消化道、泌尿

道、口腔及耳鼻喉、骨关节及皮肤软组织感染等。用法用量

肌肉注射、静脉注射或静滴：按总体剂量计，成人4g~8g/日

，2~4次/日。2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

2岁以上儿童剂量减半

其余参见氟氯西林钠和阿莫西林钠。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)