

舒他西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E8_88_92_E4_BB_96_E8_A5_BF_E6_c22_309744.htm 药品名称舒他西林药

物别名舒氨西林，舒氨新，氨苄西林-舒巴坦、优立新 Unasyn，Ampicillin Sodium and Sulbactam Sodium、Unasyn 英文名称Sultamicillin#093. 类别 - 内酰胺酶抑制剂制剂片剂

: 0.375g(甲苯磺酸舒他西林sultamicillin tosilate，氨苄西林钠与舒巴坦摩尔比为1:1)；粉针剂：0.75g，1.5g(氨苄西林与舒巴坦钠重量比为2:1)。分子式成分氨苄青霉素、舒巴坦药理毒理本品为氨苄青霉素和舒巴坦的混合制剂，重量（效价）比为2:1。口服制剂比为1:1。以甲烯基相结合，形成双酯结构化合物。由于舒巴坦为一不可逆性β-内酰胺酶抑制剂，因而与氨苄青霉素组成复合制剂时，能有效地保护该抗生素不被水解，维持其原有的抗菌活性。一些对氨苄青霉素耐药的病菌如葡萄球菌属、流行性感嗜血杆菌、淋球菌、脆弱类杆菌及某些肠杆菌属菌株，由于氨苄青霉素与舒巴坦合用后，又再次恢复了对氨苄青霉素的敏感性。药动学氨苄西林钠与舒巴坦钠的代谢相似，本品T_{1/2}为1h，大部分以原形自尿中排出。适应症用于敏感菌所致的感染，如菌血症、心内膜炎、脑膜炎、呼吸道感染、泌尿系统感染、胆管或肠道感染等不良反应有皮疹、瘙痒、腹泻、恶心、呕吐和肌注后局部疼痛、静脉炎用法用量按制剂总量计。空腹口服：成人0.375g/次，2~4次/日。肌肉或静脉注射：成人1.5g~12g/日，2~3次/日；儿童每日150mg/kg，分次给予。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。新生儿慎用。口服时宜多饮水。其余参阅氨苄西林。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com