

磷酸羟基哌喹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_A3_B7_E9_85_B8_E7_BE_9F_E5_c22_309786.htm 药品名称磷酸羟基哌喹
药物别名西军214 英文名称Hydroxypiperaquine Phosphate 类别
主要作用于预防疟疾的抗疟药 药理毒理本品对恶性疟和间日疟原虫红细胞内期均有较强的杀灭作用；但复发率略高于氯喹，对恶性疟的退热和血中原虫转阴的时间优于氯喹；在对氯喹耐药性较普遍的地区，使用本品治疗可获满足的效果。适应症在疟疾流行季节，用作抑制性预防药，效果良好。此外，对已确诊的、期单纯矽肺的治疗及煤矽肺的治疗，有一定疗效。不良反应1 不良反应稍微，仅个别病人有口四周麻胀感。2 用于预防时，少数病人有头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐等，可自行消失。3 对有严重心脏病、结核病、肝病、肾损害以及过缓性心律失常者均忌用。孕妇慎用。4 有心动过缓等不良反应，停药后可恢复。用法用量口服，治疗间日疟，首次4片，间隔8~12小时1次，第二、三次各服2片，总量8片为1疗程。治疗恶性疟，第一、二次各服4片，间隔8~12小时1次，第三次服2片，总量10片为1疗程。治疗矽肺，首日2片/次、2次/日；第二日开始2片/次，2次/周，早饭后服，3个月为1疗程。停药1个月后继续进行第二个疗程。预防量，4片/次。间隔15日服药1次，睡前服，可连服3个月。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com