

对乙酰氨基酚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022_E5_AF_B9_E4_B9_99_E9_85_B0_E6_c22_309848.htm 药品名称对乙酰氨基酚药物别名扑热息痛，醋氨酚，Acetaminophen 英文名称Paracet 类别解热镇痛药性状白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦。在热水或乙醇中易溶，在丙酮中溶解，在水中略溶。制剂片剂：每片0.3g；0.5g。胶囊剂：每胶囊0.3g。氨酚待因片〔基〕 每片含对乙酰氨基酚0.5g及可待因84mg。口服液：每支0.25g（10ml）。栓剂：每粒0.15g；0.3g；0.6g。直肠给药，1次0.3～0.6g，1日1～2次。3～12岁小儿，1次0.15～0.3g，1日1次。注射液：每支0.075g（1ml）；0.25g（2ml）。分子式成分药理及应用有解热、镇痛作用。解热作用类似阿司匹林，但镇痛作用较弱。对血小板及凝血机制无影响。口服后吸收迅速，t_{1/2}为75～180分，吸收后可分布全身，血浆蛋白结合率25%～50%。主要由尿中排泄。用于感冒发烧、关节痛、神经痛及偏头痛，癌性痛及手术后止痛。用法用量口服1次0.3～0.6g，1日0.6～1.8g。1日量不宜超过2g，疗程不宜超过10日。儿童12岁以下按每日1.5g/M²分次服。按年龄计：2～3岁，160mg；4～5岁，240mg；6～8岁，320mg；9～10岁，400mg；11岁，480mg。每4小时或必要时服1次。肌内注射，1次0.15～0.25g。注意事项（1）不良反应较少，不引起胃肠出血。（2）可引起恶心、呕吐、出汗、腹痛及苍白等。（3）剂量过大可引起肝脏损害，严重者可致昏迷甚至死亡。如有可能可测定本品血药浓度或t_{1/2}以了解肝损程度。（4）3岁以下儿童及新生儿因肝、肾功能发育不全，应避免使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 www.100test.com