

盐酸依米丁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_BE\\_9D\\_E7\\_c22\\_309855.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E4_BE_9D_E7_c22_309855.htm) 药品名称盐酸依米丁  
药物别名盐酸吐根碱 Cephaeline Methyl Ether 英文名称Emetine Hydrochloride 类别抗阿米巴病药制剂注射液：1ml：30mg、1ml：60mg。药动学皮下或深部肌肉注射，Tmax 24h，大部分集中于肝脏，其次为肾、肺、脾等，肠壁及脑等分布较少。主要经肾排出。反复给药易蓄积。适应症肠和肠外阿米巴病。不良反应常见有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等(用前静注10%葡萄糖酸钙注射液10ml可减轻副反应)。对心肌损害可表现为血压下降、心前区痛等，如有心电图变化，应立即停药。用法用量皮下或深部肌肉注射：每日1mg/kg，不宜超过60mg/日，2次/日，连用6~10日为1疗程。如未愈，间隔2月后再予第二疗程注重事项本品排泄缓慢，易蓄积中毒，不宜长期连续使用。重症心脏病、高度贫血、肝、肾功能明显减退、老弱、孕妇与幼婴均禁用。注射前后2h，必须卧床休息，检查心脏与血压有无改变，本品不可静脉给药，也不能口服。本品对包囊无效。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)