

大观霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_A7_E8_A7_82_E9_9C_89_E7_c22_309914.htm

药品名称大观霉素药

物别名奇霉素，壮观霉素，淋必治，TROBICIN 类别氨基糖

酞类性状常用其盐酸盐，为白色或类白色结晶性粉末，易溶

于水，1%溶液的pH为3.8~5.6。制剂注射用盐酸大观霉素：

每支2g，附0.9%苯甲醇注射液1支。分子式成分药理及应用对

淋病奈瑟菌有良好的抗菌作用， $< 7.5 \sim 20 \mu\text{g} / \text{ml}$ 浓度可抑制

大多数菌株。肌注2g，1小时血药浓度达峰，约为 $100 \mu\text{g} / \text{ml}$

，8小时为 $15 \mu\text{g} / \text{ml}$ 。体内药物主要由尿原形排泄， $t_{1/2}$ 约

为2.5小时。主要应用于淋球菌所引起的泌尿系感染，适用于

对青霉素、四环素等耐药的病例。用法用量1次肌注2g。将非

凡稀释液（0.9%苯甲醇溶液）3.2ml。注入药瓶中，猛力振摇

，使成混悬液（约5ml），用粗针头注入臀上部外侧深部肌肉

内。一般只用1次即可。对于使用其他抗生素治疗而迁延未愈

的患者，可按4g剂量给药，即1次用药4g，分注于两侧臀上外

侧肌肉或1次肌注2g，1日内用药2次。注重事项（1）不良反

应有注射部位疼痛、荨麻疹、眩晕、恶心、发热、寒战、失

眠等。偶见血红蛋白和红细胞压积减少、肌酐清除率降低、

以及碱性磷酸酶、BUN和氨基转移酶等值升高。也有尿量减

少的病例发生。（2）不可应用于孕妇和新生儿。（3）肾病

患者忌用。（4）不得静脉给药。（5）无明显的耳毒性。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com