

卡巴匹林钙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_8D_A1_E5_B7_B4_E5_8C_B9_E6_c22_309920.htm 药品名称卡巴匹林钙

药物别名阿司匹林钙脲乙酰水杨酸钙脲，速克痛，Carbaspirin Calcium 英文名称Carbasalate Calcium〔 〕类别解热镇痛药

性状白色粉末，极易溶于水。制剂散剂：每袋0.6g；0.3g

；0.2g；0.15g；0.1g；0.05g。药理及应用具有解热、镇痛作用。用于牙痛、伤风感冒时发热、头痛，以及神经痛、腰痛、肌肉痛、经痛等。用法用量口服：溶于水中服用。成人1次0.6~1.2g，如需要，2~4小时后重服，但24小时内不得超过3.6g

。儿童：初生~6个月，1次50mg；6个月~1岁，1次50~100mg；1~4岁，1次0.1~0.15g；4~6岁，1次0.15~0.2g；6~9岁，1次0.2~0.25g；9岁~14岁，1次0.25~0.3g。需要时2~4小时后可重服。

注重事项（1）本品可能引起胃痛，此时应停药，亦可引起胃肠道出血，久服可致贫血。（2）对阿司匹林过敏、肝功失调、出血倾向，服用抗凝血药者禁服。（3）拔牙前后不应立即服用本药，饮用含酒精饮料前后忌服，出水痘、感冒幼儿慎服，孕妇、哺乳妇女禁服。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com