

帕星肼 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_B8_95_E6_98_9F_E8_82_BC_c22_309924.htm 药品名称帕星肼药物别名

力排肺疾 Dipasic 英文名称Pasiniazid 类别抗结核病药制剂片剂

：每片100mg（其化学结构中相当于异烟肼47.3mg，对氨基水杨

酸52.7mg）。药理毒理帕星肼是异烟肼（INH）与对氨基水杨

酸（PAS）的分子化合物，为异烟肼的对氨基水杨酸盐而非二

者的简单混合物。本品呈黄色菱形结晶，与其母体INH、PAS

迥然不同。商品为片剂，每片含INH 47.3mg和PAS 52.7mg。

帕星肼在Kirchner液体培养基中药物浓度达到0.05mg / L时，

即对结核杆菌（H37Rv）产生完全的抑制作用，即使是INH

耐药菌株，本品仍有一定抑菌作用，它比同剂量的INH抗结

核杆菌作用强3~5倍。结核杆菌对本品产生耐药性极慢。药

动学帕星肼口服吸收人体内后，主要在肝脏内缓慢分解，尔

后行乙酰化而灭活。由于从尿中排出甚少，所以清除速率很

慢，T_{1/2}约10~11h。因在体内（包括血液、脑脊液及各种体

液）的存留时间延长，可达较长时间的高浓度。从服用本品的

肺结核病人手术切除的病肺组织中，发现含本品的药物浓度

相当于INH 6 μg/g和PAS 6.3 μg/g。适应症各种类型的肺结

核和肺外结核（包括结核性脑膜炎）。不良反应1）很少有

不良反应，偶有皮疹和肝脏损害；（2）极少数对异烟肼或本

品过敏者忌用。用法用量口服：一般为每千克体重10~20mg

，成人每日5~10片；儿童可视其个体需要（如急性血行播散

性结核、结核性脑膜炎）而适当增加至每千克体重20~40mg

，分3~5次，疗程6~12个月，连续用药，不宜中断。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

