

卫非特 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_8D_AB_E9_9D_9E_E7_89_B9_c22_309930.htm 药品名称卫非特 英文名称Rifater 类别抗结核病药制剂片剂：每片片剂含：利福平 rifampicin 120 mg，异烟肼 INH 80 mg，吡嗪酰胺 pyrazinamide 250 mg。分子式成分利福平、异烟肼、吡嗪酰胺固定复方糖衣片 药理毒理抗结核病药 利福平、异烟肼和吡嗪酰胺都是杀菌性抗结核药。利福平和异烟肼非凡对生长快速、繁殖旺盛的细胞外菌群有杀灭作用；对生长缓慢、间歇生长或细胞内结核杆菌也有抗菌活性。吡嗪酰胺主要作用于细胞内酸性环境中的结核杆菌。三者作用于不同的菌群，联合应用可以发挥强大的灭结核杆菌效果。药动学本品中利福平、异烟肼、吡嗪酰胺分别与单一品种相比，其药动学基本相似，生物利用度可靠。适应症结核病的短程化疗。不良反应过敏反应。胃肠道反应。肝肾功能损害。血小板及白血球减少，贫血，嗜酸性细胞增多。流感样综合征。月经不调。尿液、痰和眼泪变红色。多发性神经炎，大剂量可致惊厥，可增加癫痫发作的次数。活动性痛风相互作用利福平可降低抗凝药、肾上腺皮质激素、环孢霉素、洋地黄制剂、奎尼丁、口服避孕药、口服降糖药、氨苯砞、麻醉和止痛药、巴比妥酸盐、安定、戊脉定、b-肾上腺素阻断剂、氯贝丁脂、孕激素、双异丙吡胺、茶碱、氯霉素、酮康唑和抗惊厥药的药效。与氯烷同时使用可增加肝脏毒性。异烟肼可增强苯妥英钠的作用。用法用量体重50 kg或以上 5片 qd。体重40-49 kg 4片 qd。体重30-39 kg 3片 qd。连服二个月。注重事项对本药成分过敏者禁用。肝肾功能损害、痛风、孕妇及哺乳妇女慎用。应同时

服用维生素B6。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com