

卡巴肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_8D_A1_E5_B7_B4_E8_83_82_c22_309936.htm 药品名称卡巴肿药物别名（对脲基苯肿酸，FENARSONE）英文名称Carbarsone〔 〕类别抗阿米巴病药性状白色粉末，有微酸味，几无臭，在空气中稳定，微溶于水，乙醇，几不溶于醚、氯仿，在碱性溶液内易溶。熔点174 。制剂片剂：每片0.1g；0.2g。分子式成分是一种人工合成的五价肿剂，含砷28.85%。药理及应用本品能抑制虫体巯基酶系的活性，杀灭阿米巴滋养体。其效力不及依米丁；与喹碘方大致相近或略差。对于肠外阿米巴病无效。又可用于阴道滴虫病及丝虫病（对丝虫成虫有效，但对微丝蚴无效。对肝有损害，故不宜用于大规模防治）。用法用量（1）治阿米巴痢 每日3次，每次服0.1~0.2g，连用10天。小儿每日8mg/kg，分2~3次，连用10日。如粪便检查仍有原虫，可在停药10天以后，再如法服10天。又可用其1%溶液（内加碳酸氢钠2%）作保留性灌肠每次200ml，隔夜1次，可行5次。在灌肠期间，口服须停止。（2）治阴道滴虫病 每次0.2~0.4g，每晚或隔晚置于阴道内，7日为1疗程。（3）治丝虫病 每日服0.25~0.5g，分2次服，连用10日，常与乙胺嗪或左旋咪唑合用。注重事项（1）偶有皮疹、恶心、呕吐、腹泻，出现症状应即停药。（2）严重反应是体重减轻及多尿，偶可发生剥脱性皮炎、粒细胞缺乏症及肝炎、胃炎等。出现症状时，应立即停药。必要时可用二巯基丙醇治疗。（3）肝肾功能减退及对肿剂敏感的患者禁用。（4）肿剂能引起继发于肿性皮炎的角膜炎、中毒性视力减弱、一过性近视、视网膜和玻璃体出血。 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com