

没食子酸锑钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B2\\_A1\\_E9\\_A3\\_9F\\_E5\\_AD\\_90\\_E9\\_c22\\_309995.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_B2_A1_E9_A3_9F_E5_AD_90_E9_c22_309995.htm) 药品名称没食子酸锑钠  
药物别名（次没锑钠，锑-273，Sb-273）英文名  
称Antimony Sodium Subgallate 类别抗血吸虫病药性状类白色或乳黄色粉末，略有金属味，可溶于水。制剂中速片：每片0.3g，含没食子酸锑钠0.2g。缓释片：每片0.4g，含没食子酸锑钠0.2g。适应片：每片0.12g含没食子酸锑钠10mg。分子式成分本品为我国创制的锑剂，系锑和没食子酸钠络合物。药理及应用本品作用与酒石酸锑钾类似，特点为能口服。按照释放锑速度的不同，有缓释片和中速片两种片剂，以中速片较常用。主要用于治疗慢性早期血吸虫病。治疗后大便虫卵转阴率在70%以上。本品可由胃肠道缓慢吸收，服药后48小时血锑浓度达到最高值。在体内有蓄积作用，连续服药后，随着服药次数的增加血锑浓度相应增高。测定心、肝、肾三个脏器的含锑量，以肝脏为最高。大部分由肠道排出。如先服小量，再逐渐增量，可减少呕吐发生率，说明消化道对本品有适应性。用法用量治疗方法有10日疗法和15日疗法。10日疗法中速片的总量按没食子酸锑钠计算为0.35g / kg，15日疗法为0.4g / kg（体重超过50kg者仍按50kg计）。小儿剂量可酌情增加，年老体弱者可酌情减少。剂量的增减一般在5% ~ 10%之间。本品对胃肠道刺激性较大，故开始时要先服适应片。适应片含少量没食子酸锑钠，可稍微刺激胃肠道使其适应。在正式疗程开始前1日睡前及治疗当日早饭后，分别服适应片20mg（2片）及40mg（4片）（其药量不算在中速片的总量内）。适应片宜在饭后3小时基本空腹时服，并只用少量温开

水送下，以使药物保持一定浓度刺激胃肠道。每日所服中速片一般于早饭及晚饭后2小时服用，原则上晚饭后一顿可略多1~2片，此时饮水量不限。缓释片现少用，其10日疗法总量按没食子酸铋钠计算为 $0.5\text{g} / \text{kg}$ ，15日疗法为 $0.6\text{g} / \text{kg}$ ，其余同前。注重事项（1）毒性及不良反应基本上与酒石酸铋钾同，唯消化道反应较重。（2）15日疗法比10日疗法的不良反应少，男性比女性反应轻，儿童比成人反应缓和，因此体质较好的男患者与儿童可用10日疗法，体质较差的男患者与女患者宜用15日疗法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)