

双氯芬酸二乙胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_AF_E8_8A_AC_E9_c22_310008.htm 药品名称双氯芬酸

二乙胺 药物别名扶他林 英文名称Diclofenac Diethylamine

Emulgel 类别抗炎镇痛药制剂乳胶剂 分子式成分基质为分散于水性凝胶中的脂肪乳剂，每100克扶他林乳胶剂中含双氯芬酸二乙胺盐1.16克；相当于1克双氯芬酸钠。 药理毒理扶他林乳胶剂是一种外用抗炎药，用于治疗骨关节局部疼痛和炎症。

如：闭合性损伤，软组织风湿病，肌腱、韧带、关节的退行性或炎症性病变。 药动学扶他林乳胶剂的有效成份能迅速被皮肤吸收并聚积于皮下组织，然后渐渐释放到四周组织结构，这使有效成份能达到局部高浓度而起到良好疗效，而发生全身不良反应的危险很小。 适应症肌腱、韧带和关节的创伤后炎症，如：扭伤、拉伤和挫伤；局限性软组织风湿病，如：腱鞘炎、肩-手综合征和滑囊炎，关节四周病变；局限性风湿性疾病，例如：四肢与脊柱的骨关节炎。 不良反应偶见：过敏性或非过敏性皮炎；个别情况：一般性皮炎、过敏反应、光敏反应。 用法用量根据需治疗的面积大小，使用本品2~4克（相当于樱桃至核桃大小）涂于患处，并轻轻揉擦，每日三至四次。 注重事项对双氯芬酸、乙酰水杨酸和其他非甾体抗炎药及异丙醇或丙二醇过敏者禁用。 勿用于损伤皮肤或开放性创口；避免与眼睛及粘膜接触。 本品仅供外用，切勿入口。 药物小心存放，防止儿童误服。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com