

氟氧头孢钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E6_B0_A7_E5_A4_B4_E5_c22_310012.htm 药品名称氟氧头孢钠
英文名称Flomoxef Sodlum 类别三代头孢性状白色至浅黄白色
粉末或冻干物。无臭，极易溶于水或甲醇，溶于乙醇或无水
乙醇，几不溶于乙醚。制剂注射用氟氧头孢钠：每瓶0.5g；1g
；2g。分子式成分 本品为半合成的氧头孢烯类抗生素，抗菌
性能与第四代头孢菌素相近。药理及应用抗菌谱主要包括葡
萄球菌、链球菌（肠球菌除外）、肺炎链球菌、消化链球菌
、卡他球菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、变形杆菌、
流感嗜血杆菌以及拟杆菌等。本品静滴0.5g、1g或2g，历时1
小时，最高血药浓度分别为20 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 、45 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 和90 μg
 $/\text{ml}$ ， $t_{1/2}$ （ ）分别为73.4、49.2和40分钟。如以上量点滴2
小时，则最高血药浓度分别为10 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 、24 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 和48 μg
 $/\text{ml}$ ， $t_{1/2}$ （ ）分别为46.2分钟、57分钟和69分钟。体内分
布较广泛，可进入胆汁、痰液、腹水、骨盆死腔渗出液以及
子宫及附属器官、中耳粘膜和肺组织中。体内少部分代谢，
大部分（85%）以原形经肾排泄。肾功能减退者排出减少。
应用于上述敏感菌所致的咽炎、扁桃体炎、支气管炎、肺炎
、肾盂肾炎、膀胱炎、前列腺炎、胆道感染、腹膜炎、盆腔
炎、子宫及附属组织炎症、中耳炎、创口感染、心内膜炎及
败血症等。用法用量轻症：成人1日量1~2g，分成2次静注；
儿童1日60~80mg/kg，分2次静注或静滴。重症：成人1日4g
，分2~4次用；儿童1日150mg/kg，分3~4次用。注重事项
（1）对青霉素类过敏及过敏体质者慎用。严重肾功能障碍者
、依靠静脉营养者、高龄者及全身状态恶化者均应慎用。

(2) 不良反应有肾功能减退 (BUN上升)，造血系统变化 (红细胞减少、粒细胞减少、血红蛋白降低、嗜酸细胞增多、血细胞比容下降、血小板减少或增多，并罕见溶血性贫血)，肝酶单项或多项上升，恶心、呕吐、腹泻、软便、伪膜性肠炎 (罕见)，皮疹及瘙痒，过敏性休克，药物热，咳嗽、呼吸困难及肺X光影象改变症状，口腔炎，头晕、倦怠、血或尿淀粉酶升高以及注射局部静脉炎等。(3) 对孕妇及新生儿的用药安全性尚未确定，一般不宜应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com