

双氯芬酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_AF_E8_8A_AC_E9_c22_310022.htm 药品名称双氯芬酸钠
药物别名双氯灭痛、扶他林、戴芬 英文名称Diclofenac Sodium#093. 类别抗炎镇痛药制剂缓释片剂：25mg、50mg、75mg。栓剂：50mg。双氯芬酸钠片剂：25mg；胶囊剂（诺福丁，Novolten）：25mg。双氯芬酸钠凝胶剂（扶他林Voltaren）：1%。分子式成分邻-（2，6-二氯苯胺基）苯乙酸钠
药理毒理非甾体抗炎药（NSAID）可选择性切断花生四烯酸代谢系列中环氧合酶的作用环节，阻断前列腺素E₂（PGE₁）的合成途径，具有消炎、镇痛、解热作用。药动学口服吸收迅速而完全，直肠给药T_{max}约0.5h~2h。血浆蛋白结合率99%，约50%在肝脏代谢，40%~65%从肾排出，35%从胆汁、粪便排出，1.2h~2h排泄完。适应症急慢性风湿性关节炎或类风湿性关节炎、急慢性骨关节炎、急慢性强直性脊椎炎等，也可用于痛经。感冒通用于感冒、头痛、咽喉痛、关节及肌肉痛等。不良反应可引起胃肠道反应、头痛、过敏性皮疹、肾功能异常等，罕见心率不齐、耳鸣和导致骨髓抑制。相互作用可增高地高辛和碳酸锂血药浓度，降低胰岛素作用。阿斯匹林能降低本品的生物利用度。用法用量口服，成人类风湿性关节炎150mg~200mg/日，分2次~4次服，达疗效后逐渐减至最小有效量，通常为75mg~100mg/日，分3次服用；骨关节炎开始100mg~150mg/日，分2次~3次服，达疗效后逐渐减至最小有效量；强直性脊椎炎开始100mg~125mg/日，分4次~5次服，达疗效后逐渐减至最小有效量；儿童（1岁以上）每日按体重0.5mg~2mg/kg，分2次~3次服。栓剂

，50mg/次。肌内注射，75mg/次，1次/日，严重情况可2次/日，应作深部臀肌注射。外用，凝胶剂涂搽，4次/日。奥湿克口服，1片/次，2次/日。注重事项妊娠B类，妊娠期禁用。肾功能不全、溃疡病患者慎用，有肛门炎者禁用直肠给药。本品须整片吞服，勿嚼碎。对单纯发热患者不适用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com