

硝硫氰胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_9D_E7_A1_AB_E6_B0_B0_E8_c22_310034.htm 药品名称硝硫氰胺
药物别名（7505、硝二苯胺异硫氰）英文名

称Nithiocyanamine 类别抗血吸虫病药性状黄色结晶粉末，不溶于水，微溶于苯、氯仿。熔点198~201。制剂胶囊剂：每胶囊25mg；50mg。片剂：每片25mg。药理及应用本品为近年合成的一种抗血吸虫病新药，对成虫有杀灭作用（可能由于虫体三羧循环代谢受到干扰，虫体缺乏能量供给，最后导致死亡），给药后第2日可见虫体全部肝移。对童虫的作用较对成虫为弱，较大剂量才能阻止其发育为成虫。临床上可用于各型血吸虫病。对急性血吸虫病患者，退热较快，有确实疗效。对慢性血吸虫病效果也好，6个月后阴转率约为80%~35.4%。对有并发症的病人也可应用。此外，对钩虫病、姜片虫病也有效。用法用量微粉胶囊：口服量6~7mg/kg，总量不超过350mg，分3次服，每日1次。固体分散片剂：总剂量125~175mg，分3次服，3日内服完。治钩虫病：125mg，每次服时间间隔2~4小时，1日内服完。注重事项（1）副作用主要有腹胀、腹痛、食欲减退、恶心、呕吐、肝区压痛、头痛、头晕、失眠、多梦、神经衰弱综合征、肌无力、共济失调、植物神经功能紊乱等（停药后可恢复）。偶出现黄疸（可用一般利胆药及护肝药，多能较快恢复）。（2）精神病人绝对禁用，有功能眩晕史者（如瘧病、神经衰弱）列为相对禁忌。肝炎病人，氨基转移酶升高，大便多次孵化阴性者不宜用。孕妇、授乳妇女禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com