

头孢克肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_85\\_8B\\_E8\\_c22\\_310043.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_85_8B_E8_c22_310043.htm) 药品名称头孢克肟  
药物别名世伏素，FK027，CEFSPAN 英文名称Cefixime 类别  
三代头孢性状白色至淡黄色结晶性粉末，无味，具稍微特异  
臭，易溶于甲醇、二甲亚砷，略溶于丙酮，难溶于乙醇，几  
不溶于水、醋酸乙酯、乙醚、己烷中。制剂胶囊剂：胶  
囊50mg或100mg；颗粒：每g中含本品50mg（效价）。分子式  
成分 本品为口服用的第三代头孢菌素类抗生素。药理及应用  
本品具第三代头孢菌素的抗菌特性，其抗菌谱包括链球菌、  
肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、卡他布拉汉  
菌、沙雷杆菌、枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌、流  
感嗜血杆菌等。对细菌的β-内酰胺酶甚稳定。正常人1次空  
腹口服50mg、100mg、200mg，4小时血中药物水平达峰，分  
别为0.69 μg/ml、1.18 μg/ml、1.95 μg/ml，t<sub>1/2</sub>为2.3~2.5  
小时。儿童1次按1.5mg/kg、3.0mg/kg、6.0mg/kg空腹服用  
，3~4小时血药水平达峰，分别为1.14 μg/ml、2.01 μg/ml  
、3.97 μg/ml，t<sub>1/2</sub>为3.2~3.7小时。体内分布，以痰、扁桃  
体、颌窦、中耳分泌物及胆汁中浓度较高。0~12小时的尿排  
泄率为20%~25%，口服50mg，4~6小时尿液药物峰浓度  
为42.9%。临床上应用于上述敏感菌所引起的肺炎、支气管  
炎、泌尿道炎、淋病、胆囊炎、胆管炎、猩红热、中耳炎、  
副鼻窦炎等。贮存室温保存，有效期2年。用法用量成人及体  
重30kg以上的儿童：1次50~100mg，1日2次；重症1次口服量  
可增至200mg。儿童：1次1.5~3mg/kg，1日2次，重症1次量  
可增至6mg/kg。注重事项（1）本品偶引起过敏性反应，如

皮疹、瘙痒、发热、颗粒性白细胞减少、嗜酸细胞增多、血小板减少；可致肝氨基转移酶及碱性磷酸酶升高；可致菌群失常、并引起维生素缺乏或二重感染，也可致过敏性休克。

（2）本品可干扰尿糖反应，使Benedict、Fehling及Clintest试验出现假阳性反应。并可使直接血清抗球蛋白试验（Coombs test）出现阳性反应。（3）肾功能不足者应减量使用。（4）孕妇、新生儿、早产儿均宜慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)