

硫氯酚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_AB_E6_B0_AF_E9_85_9A_c22_310049.htm 药品名称硫氯酚 药物别名（硫双二氯酚，别丁，Bitin）英文名称Bithionol〔 〕类别抗其他吸虫病药 性状白色结晶粉末，无臭或略带酚臭；熔点188 。极难溶于水，微溶于乙醇（0.3%），能溶于脂肪油、丙酮等。制剂片剂：每片0.25g。胶囊剂：每粒0.5g。分子式成分药理及应用本品对肺吸虫囊蚴有明显杀灭作用，临床用于肺吸虫病、牛肉绦虫病、姜片虫病。对华支睾吸虫病疗效较差。本品口服易吸收，达C_{max}为27小时。用法用量口服：每日50~60mg/kg（成人与小儿同）。对肺吸虫病及华支睾吸虫病，可将全日量分3次服，隔日服药，疗程总量30~45g。对姜片虫病，可于睡前半空腹将2~3g药物1次服完。对牛肉绦虫病，可将总量（50mg/kg）分2次服，间隔半小时，服完第2次药后3~4小时服泻药。注重事项（1）有轻度头晕、头痛、呕吐、腹痛、腹泻和荨麻疹等反应，可有光敏反应，也可能引起中毒性肝炎。（2）服本品前应先驱蛔虫和钩虫。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com