

乙硫异烟胺 Ethionamide [] (TH-1314) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E4_B9_99_E7_A1_AB_E5_BC_82_E7_c22_310054.htm 药品名称乙硫异烟胺

Ethionamide [] (TH-1314) 英文名称Ethionamide []

(TH-1314) 类别抗结核病药性状亮黄色结晶性粉末，微有硫化物臭和二氧化硫味。几不溶于水，溶于乙醇(1:30)。水混悬液接近中性，遇光变色。制剂肠溶片：每片0.1g分子式成分药理及应用对结核杆菌有抑菌作用，抗菌活性仅为异烟肼的十分之一。本品口服易吸收，体内分布广，可渗入全身体液(包括脑脊液)，在体内全部代谢为无效物。对渗出性及浸润性干酪病变疗效较好。单独应用少，常与其他抗结核病药联合应用以增强疗效和避免病菌产生耐药性。用法用量日量0.5~0.8g，一次服用或分次服(以一次服效果为好)，必要时也可从小剂量(0.3g/日)开始注重事项(1)服药后有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、厌食、胃部不适等症状，多于服药2~3周后发生，如不能耐受，可酌减剂量或暂停服药，俟症状消失后继续服用。如合用碳酸氢钠，或服肠溶片，可减轻反应。在发生呕吐时，可同时使用止吐药物。(2)少数患者有糙皮病症状、精神抑郁、视力紊乱和头痛、末梢神经炎、经期紊乱、男子乳房女性化、脱发、关节痛、皮疹、痤疮等。(3)20%~30%病人可对肝功能有影响，引起氨基转移酶升高，并可发生黄疸，故每月应测肝功能一次。(4)孕妇和12岁以下儿童禁用。(5)大剂量可引起体位性低血压。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com