

利福定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_88_A9_E7_A6_8F_E5_AE_9A_c22_310124.htm 药品名称利福定 药物别名异丁哌利福霉素 英文名称Rifandin 类别抗结核病药 性状砖红色结晶性粉末，无臭，味微苦，极微溶于水，微溶于甲醇，易溶于氯仿。制剂胶囊：每胶囊150mg、75mg。药理及应用 抗菌谱与利福平相似，对结核杆菌、麻风杆菌有良好的抗菌活性，其用量为利福平的1/3时，可获得近似或较高的疗效。对金黄色葡萄球菌有良好作用，对部分大肠杆菌也有一定抗菌活性。此外，对沙眼病毒也有抑制作用。口服吸收良好，2~4小时血药浓度达峰。体内分布广，以肝脏和胆汁中为最高，其余依次为肾、肺、心、脾，在脑组织中含量甚微。主要用于肺结核和其他结核病、麻风病、化脓性皮肤病、结膜炎、沙眼等。贮存避光干燥处保存。用法用量成人每日150~200mg，早晨空腹一次服用。儿童按3~4mg/kg，一次服用。治疗肺结核病的疗程为1/2~1年。眼部感染采取局部用药（滴眼剂浓度0.05%）。注重事项（1）与利福平显示交叉耐药性，故本品不适于利福平治疗无效的病例。（2）对消化道有刺激，可引起恶心、呕吐、腹泻等副作用。（3）用药期间，应定期作血、尿常规和肝、肾功能检查，肝、肾功能不良者应慎用。（4）孕妇慎用。（5）曾有报道称可引起男子乳房女性化。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com