

利福霉素钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_88\\_A9\\_E7\\_A6\\_8F\\_E9\\_9C\\_89\\_E7\\_c22\\_310129.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_88_A9_E7_A6_8F_E9_9C_89_E7_c22_310129.htm) 药品名称利福霉素钠  
英文名称Rifamycin Sodium 类别抗结核病药性状砖红色粉末，  
几无臭。溶解于水，易溶于无水乙醇或甲醇中，溶于氯仿，  
几不溶于乙醚。5%水溶液的pH为6.5~7.5。本品遇光易分解  
变色。制剂注射用利福霉素钠：每瓶250mg。注射液：每  
支0.25g（5ml），供静滴用；0.125g（2ml），供肌注用。药理  
及应用对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素和耐新青霉素株）、  
结核杆菌有较强的抗菌作用。对常见革兰阴性菌的作用弱。  
口服吸收差。注射后体内分布以肝脏和胆汁内为最高，在  
肾、肺、心、脾中也可达治疗浓度。与他类抗生素或抗结核  
药之间未发现交叉耐药性。用于不能口服用药的结核患者和  
耐药金葡菌引起的胆道、呼吸道、泌尿道等部位感染。贮存  
遮光，保存于阴暗干燥处。用法用量（1）肌注：成人1  
次250mg，每8~12小时1次。（2）静注（缓慢推注）：1  
次500mg，1日2~3次。小儿1日量10~30mg/kg。此外亦可稀  
释至一定浓度局部应用或雾化吸入。重症患者宜先静脉滴注  
，待病情好转后改肌注。用于治疗肾盂肾炎时，每日剂量  
在750mg以上。对于严重感染，开始剂量可酌增到1000mg/d  
。注重事项（1）本品的副作用参见利福平。（2）肌注可引起  
局部疼痛，有时可引起硬结、肿块。（3）静注后可出现  
巩膜或皮肤黄染。（4）本品偶引起耳鸣、听力下降。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)