

硫酸巴龙霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_B7\\_B4\\_E9\\_c22\\_310144.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_B7_B4_E9_c22_310144.htm) 药品名称硫酸巴龙霉素 药物别名巴母霉素，巴罗姆霉素 Humatin，PRM 英文名称 Paromomycin#093. 类别抗痛风药制剂片剂：0.1g(10万U)、0.25g(25万U)。本品为白色或微黄色片，或糖衣片。分子式成分药理毒理药理本品为氨基糖苷类抗生素。巴龙霉素的抗菌谱与新霉素和卡那霉素基本相同。对革兰阳性和阴性细菌均有抑制作用，以对志贺菌属和金葡菌的作用较显著，对铜绿假单胞菌和厌氧菌无作用。对阿米巴原虫有较强抑制作用，对利什曼原虫、隐孢子虫、丝虫等亦有良好作用。毒理巴龙霉素的耳、肾毒性大，故一般不宜作全身应用。药动学口服吸收很少，绝大多数以原形由肠道排泄。适应症肠阿米巴病、细菌性痢疾及细菌性肠道感染，也可治疗绦虫病。 1 . 主要用于肠阿米巴病的治疗，对肠外阿米巴病无效。 2 . 可用于肠道隐孢子虫病的治疗。 3 . 亦可用于结肠手术前预备及肝昏迷等。不良反应食欲减退、恶心、呕吐、腹部不适及轻度腹泻和头晕。长期口服可引起二重感染。相互作用本品不宜与其他肾毒性或耳毒性药物合用。用法用量口服，每日30mg/kg，3~4次/日，5日为1疗程。肠阿米巴病成人一次0.5g，一日3次，共7日。儿童一日30mg/kg，分3次服用。隐孢子虫病成人一次0.5~0.75g，一日3次。结肠手术前预备及肝昏迷患者成人一次1g，一日3次。 #093.本品无特异性拮抗药，药物过量时主要是对症疗法和支持疗法，如洗胃、用催吐药及补液等。 注重事项肾功能不良者禁用。对巴龙霉素或其他氨基糖苷类抗生素过敏的患者禁用。 1 . 交叉过敏对一

种氨基糖苷类抗生素如链霉素、庆大霉素或阿米卡星过敏的患者也可能对本品过敏。 2 . 在用药过程中宜定期进行尿常规和肾功能测定，以防止出现肾毒性，并进行听力检查或听电图测定。 3 . 下列情况应慎用本品：失水、第8对脑神经损害、重症肌无力、帕金森病、肾功能损害及溃疡性结肠炎患者。 4 . 长期口服本品的慢性肠道感染患者，尤其伴有肾功能减退或同服其他耳毒性或肾毒性药物者，尤应注重出现肾毒性或耳毒性症状的可能。 #093.本品口服虽很少吸收，但妊娠期妇女宜慎用。哺乳期妇女在服用本品期间应暂停哺乳。 #093.目前尚缺少早产儿与新生儿安全应用本品的资料，故早产儿与新生儿不宜应用。 #093.老年患者宜慎用本品。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)