

硫酸卡那霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_8D_A1_E9_c22_310171.htm 药品名称硫酸卡那霉素
药物别名卡那霉素A Kantrex，英文名称Kanamycin Sulfate
类别氨基糖酐类制剂粉针剂：0.5g，1g；滴眼剂
：2%8ml(10mg/ml.10mg/分)时用正常剂量的20%~30%，每24
~48小时1次。#093.由于缺少特异性拮抗剂，卡那霉素过量
或引起毒性反应时，主要用对症疗法和支持疗法，同时补充
大量水分。血液透析或腹膜透析有助于从血中清除卡那霉素。
注重事项妊娠D类。妊娠、哺乳期妇女禁用。儿童、老年、
长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听力或前庭
功能监测。本品耐药菌较普遍，药敏试验证实敏感后方可使用。
不可静脉注射。对本品或其他氨基糖苷类药物有过敏史者禁用。
1. 对一种氨基糖苷类抗生素，如链霉素、庆大霉素、阿米卡星等
过敏的患者，可能对本品也过敏。2. 在用药过程中应注重进行
下列检查：(1)尿常规检查和肾功能测定，以防止出现严重肾毒
性反应。(2)听力检查或听电图尤其高频听力测定，对老年人更
为重要。3. 有条件时应监测血药浓度，尤其新生儿，老年和肾功
能减退的患者。每12小时给药1次时，血药峰浓度宜保持在15~30mg/ml，
谷浓度5~10mg/ml；每24小时用药1次时血药峰浓度宜保持56~64mg/ml，
谷浓度#091.孕妇及哺乳期妇女用药#091.儿童用药#091.老年患者
用药#093.老年患者应用本品易引起各种毒性反应，因此有条件
时应在疗程中监测血药浓度，此外老年患者的肾功能有一定程
度的生理性减退，即使其肾功能测定值在正常范 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com