

甲苯咪唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_94_B2_E8_8B_AF_E5_92_AA_E5_c22_310206.htm 药品名称甲苯咪唑药物别名甲苯达唑，二苯酮咪胺酯，安乐士，VERMOX，ANTIOX，MEBENDACIN，NOVERME，TELMIN，VERMIRAX）英文名称Mebendazole 类别驱蛔虫药及广谱驱虫药性状白色、类白色或微黄色结晶性粉末；无臭。在丙酮或氯仿中极微溶解，在水中不溶，在甲酸中易溶，在冰醋酸中略溶。制剂片剂：每片100mg；香味口服混悬液：20mg/ml，每瓶30ml。复方甲苯咪唑片（速效肠虫净片）；每片含甲苯咪唑100mg和左旋咪唑25mg。驱蛲虫：1片顿服；驱蛔虫：2片顿服；驱钩虫或蛔、钩、鞭虫混合感染：每日2次，1次1片，连服3日。成人及4岁以上儿童按上述剂量，4岁以下遵医嘱。服药期间不服泻药，不忌饮食。孕妇忌用。复方甲苯咪唑丸：每丸含甲苯咪唑5mg，盐酸左旋咪唑1.25mg。驱蛲虫：20粒顿服，用药2周和4周后各重复用药1次；驱蛔虫：40粒顿服；驱鞭虫、钩虫或蛔虫、鞭虫、钩虫混合感染：1次20粒，1日2次，连服3日。复方甲苯咪唑乳膏（海蜜克）：每支1g，含甲苯咪唑0.15g，盐酸左旋咪唑0.1g。驱蛔虫、蛲虫，6岁以上儿童及成人1支，2~6岁儿童1/2支，1次性涂于腹部或大腿内侧皮肤上，涂药面积20×20cm²。第3天重复使用1次。分子式成分药理及应用本品为一广谱驱肠虫药，体内或体外试验均证实能直接抑制线虫对葡萄糖的摄入，导致糖原耗竭，使它无法生存，具有显著的杀灭幼虫、抑制虫卵发育的作用，但不影响人体内血糖水平。可用于防治钩虫、蛔虫、蛲虫、鞭虫、粪类回线虫等肠道寄生虫病。用法用量驱除

钩虫、鞭虫：每次100mg，日服2次，连服3~4天；驱除蛔虫、蛲虫；顿服200mg，一次即可。不分年龄、体重，采用同一剂量注重事项（1）少数病例可出现稍微头昏、腹泻、腹部不适，偶有蛔虫游走造成腹痛或吐蛔现象（与小剂量噻嘧啶合并应用后可避免发生），但均不影响治疗。（2）除习惯性便秘者外，不需服泻药。（3）动物试验表明本品可致畸胎，故孕妇忌用。（4）严重的副作用多发生于剂量过大、用药时间过长、间隔时间过短或合用肾上腺皮质激素的病例，应引起注重。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com