

阿苯哒唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_BF\\_E8\\_8B\\_AF\\_E5\\_93\\_92\\_E5\\_c22\\_310210.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_98_BF_E8_8B_AF_E5_93_92_E5_c22_310210.htm) 药品名称阿苯哒唑药物别名丙硫咪唑，肠虫清、阿苯唑、抗蠕敏、扑尔虫、丙硫丙咪唑、阿苯达唑 Zentel 英文名称Albendazole#093. 类别驱蛔虫药及广谱驱虫药制剂片剂：200mg、400mg。药理毒理本品是一种广谱驱虫药，它对多种蠕虫感染，均有良好疗效；对蛔虫、钩、蛲虫感染的疗效显著。本品为广谱驱虫药，可选择性与不可逆性地抑制虫体摄取葡萄糖，使虫体内源性糖原耗竭，并抑制延胡索酸还原酶，阻碍三磷酸腺苷的产生，致使虫体因能源耗竭而逐渐死亡。药动学肠道吸收很慢，口服后Tmax为2.5~3h，本品及代谢产物大部分自尿排出，其余自粪便排出。T1/2为8.5~10.5h。本药属苯并咪唑类药物，口服后95%不吸收，在肠内直接对成虫和虫卵作用，24hr内由粪便排出，吸收的5%在肝内迅速代谢为砒和亚砒，后者可杀灭组织内的幼虫和肠道内的成虫和虫卵，并在48hr内通过肾脏排出，在体内无蓄积作用。适应症蛔、钩、蛲虫感染。亦用于旋毛虫、绦虫和囊虫病、粪类圆线虫病。不良反应口干、恶心、轻度腹痛、胃部不适、食欲减退等，亦有头晕、乏力、畏寒等。用法用量蛔虫及蛲虫病：成人，400mg，顿服；儿童，200mg，顿服。钩虫病、鞭虫病、粪类圆线虫病：每次200mg，2次/日，连服3日。旋毛线虫病，600mg~800mg/日。2次/日，疗程7日。注重事项孕妇及哺乳期妇女禁用。有癫痫病史及其它药物过敏史者慎用。孕妇及哺乳期妇女及2岁以下儿童禁用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)