

硫酸妥布霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_A6\\_A5\\_E5\\_c22\\_310227.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_A6_A5_E5_c22_310227.htm) 药品名称硫酸妥布霉素  
药物别名乃柏欣、托普霉素、妥布接霉素、妥布毒素  
Nebcin，Obracine，Tobradistin 英文名称Tobramycin#093. 类别  
氨基糖甙类制剂注射剂：20mg，40mg，80mg；粉针剂：1g  
，2g。 药理毒理本品为氨基糖甙类广谱抗生素，主要对革兰  
阴性菌，如绿脓杆菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、肠杆菌属、  
变形杆菌、枸橼酸杆菌有效。药动学肌注后吸收迅速  
，Tmax为0.3h，主要以原形经肾脏排出，T1/2为2h。适应症  
用于敏感菌所致下呼吸道感染、腹腔感染、骨和软组织感染  
、复杂尿路感染及菌血症、脑膜炎等。不良反应具不可逆耳  
毒性，亦具肾毒性。罕可致神经肌肉阻滞。请参阅硫酸庆大  
霉素相互作用参阅硫酸庆大霉素。用法用量肌肉注射、静脉  
滴注：成人或儿童，每日3mg~5mg/kg，2~3次/日。疗程不  
宜超过10日。 注重事项妊娠D类。妊娠、哺乳期妇女禁用。  
其余参阅硫酸庆大霉素。 100Test 下载频道开通，各类考试题目  
直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)