

芬布芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_8A_AC_E5_B8_83_E8_8A_AC_c22_310235.htm 药品名称芬布芬 药物别名联苯丁酮酸，LEDERFEN，BUFEMID，NAPONOL 英文名称Fenbufen 类别抗炎镇痛药 性状白色或类白色结晶性粉末；无臭；味酸。在乙醇中溶解，在水中几乎不溶；在热碱溶液中易溶。熔点185~188℃。制剂片（胶囊）剂：每片（胶囊）150mg。分子式成分药理及应用为一较新型的长效非甾体消炎镇痛药。据动物实验结果，本品的消炎、镇痛作用虽较吲哚美辛低，但比阿司匹林强。毒性比吲哚美辛小，胃肠道副作用小于阿司匹林及其他非甾体消炎镇痛药。药理研究表明，本品在体内代谢成联苯乙酯，后者可抑制前列腺素的合成，从而阻断炎症介质的作用，认为这是本品消炎作用的主要机制。芬布芬作为联苯乙酯的前体物，口服后可避免直接服用活性代谢物对胃肠道的刺激。经国内试用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎，总有效率为87%。本药一般能使类风湿因子、血沉、抗链O等指标恢复正常或转阴。病理学检查未见主要脏器有明显病理改变。口服后2小时血药浓度达峰值。t_{1/2}为12~17小时。用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎及痛风等的治疗。亦用于牙痛、手术后疼痛、外伤疼痛等的止痛。贮存遮光、密闭保存。用法用量口服，成人一日0.6~0.9g，一次或分次服。多数患者晚上一次口服0.6g即可。分次服用时每日总量不得超过0.9g。注重事项（1）少数患者服后有胃痛、恶心、头晕、皮疹、白细胞数微降等。个别患者出现氨基转移酶微升现象，但停药1周即自行恢复正常。（2）14岁以下儿童不宜服用。（3）胃与

十二指肠溃疡者及孕妇、哺乳期妇女慎用。100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com