

非普拉宗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_9D_9E_E6_99_AE_E6_8B_89_E5_c22_310239.htm 药品名称非普拉宗药

物别名戊烯苯唑酮，戊烯保泰松，戊烯松 Methrazone

，Phenylprenazone，Prenazo 英文名称Feprazone 类别抗炎镇痛

药制剂片剂：每片100mg。分子式成分化学名为4-戊烯基-1

，2-二苯基-3，5-吡唑二酮。本品为白色或类白色结晶性粉

末；无臭，无味。在丙酮或氯仿中易溶，在苯或10%氢氧化钠溶液中溶解，在甲醇或乙醇中微溶，在水中不溶。熔点156

.5。pKa5.09±0.07。药理毒理本品作用与保泰松相似

。消炎、抗风湿作用强，抗痛风作用弱。作用机制主要是抑制前列腺素的合成。药动学口服后迅速从胃肠道吸收，4

~6h血药浓度达峰值，血浆T_{1/2}为24h。本品在体内转化后，以代谢物形式自尿中排泄。适应症风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、肌纤维组织炎、肩周炎、血栓性静脉炎、牙质组织炎、上呼吸道感染等。不良反应副作用较少，对胃肠耐受性好。少数病人服用后食欲差。恶心、呕吐、头痛、皮疹、全身瘙痒、面部浮肿等，但比保泰松稍微，一般不影响继续治疗，停药后即自行消失。相互作用本品可增强香豆素类口服抗凝血药、胰岛素、磺酰脲类口服降其糖药、甲氨蝶吟和苯妥英钠的作用，应用时须减量慎用。用法用量口服：开始剂量为0.2g/次，2~3次/d，维持量为0.1~0.2g/d。注重事项消化道溃疡、心脏病、肝肾功能不全、凝血功能障碍者应慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com