

氟苯哒唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E8_8B_AF_E5_93_92_E5_c22_310248.htm 药品名称氟苯哒唑药物别名氟化甲苯哒唑、氟苯咪唑 英文名称Flubendazole 类别驱蛔虫药及广谱驱虫药药理毒理为一新的广谱高效抗蠕虫药；作用机制是导致寄生虫的消化道内皮细胞解体而使细胞溶解以致死亡。适应症治疗棘球蚴、囊虫、蛔虫、鞭虫、钩虫、蛲虫、粪圆线虫、盘尾丝虫、华支睾吸虫、后睾吸虫及异形吸虫的感染。且对钩、蛔性皮肤幼虫移行症有效。对疥螨病也有相当疗效。常用于单一感染和寄生虫混合感染的治疗。不良反应偶有恶心、腹痛、疲惫等稍微反应。用法用量1 驱蛔虫、鞭虫 300mg/日，连服2日。或200mg~500mg顿服1次。2 治棘球蚴病 每日50mg/kg，连服14日。必要时反复治疗。3 治疥螨病 3g/日，连用3日为一疗程。并另加25%苯甲酸苄酯乳剂，局部涂擦效果好。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com