

枸橼酸哌嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_9E_B8_E6_A9_BC_E9_85_B8_E5_c22_310257.htm 药品名称枸橼酸哌嗪
药物别名驱蛔灵 英文名称Piperazine Citrate #093. 类别驱蛔虫
药及广谱驱虫药制剂片剂：0.5g；糖浆剂：1ml：0.16g；六一
宝塔糖(每粒含磷酸哌嗪0.2g)。药理毒理本品具有麻痹蛔虫肌
肉的作用，其作用机制，可能是哌嗪在虫体神经肌肉接头处
，发挥抗胆碱作用，阻断神经冲动的传递，使虫体肌肉麻痹
而不能附着在宿主肠壁，随粪便排出。药动学口服后易吸收
，Tmax 为1～2h，主要在肝脏代谢，其余经肾排出，T1/2约
为1h。适应症肠蛔虫病及蛔虫所致的不完全性肠梗阻和胆管
蛔虫病绞痛，也用于驱除蛲虫不良反应可引起头痛、恶心、
呕吐、眩晕；偶可有荨麻疹、嗜睡、便秘等用法用量驱蛔虫
，3g～4g/日，睡前顿服或2次/日，连服2～3日。儿童每日0.1g
～0.16g/kg(每日剂量不得超过3g)，睡前顿服，连用2日。驱蛲
虫：1g～1.2g/次，2次/日，连服7～10日。儿童，每次30mg/kg
，2次/日(剂量不得超过2g/日)，连服7～10日。六一宝塔糖小
儿每岁服1粒，睡前顿服。必要时隔两周后可重复治疗。注重
事项肝病、肾病、神经系统疾病或癫痫患者，均不宜使用。
有便秘者可加服泻药 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com