

洛索洛芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B4_9B_E7_B4_A2_E6_B4_9B_E8_c22_310259.htm 药品名称洛索洛芬药物别名乐松 英文名称loxoprofen 类别抗炎镇痛药制剂60mg/片 分子式成分本药每片含氯索洛芬68.1 mg，相当于无水化物60 mg，为极淡红色的药片。药理毒理抑制前列腺素生物合成作用，其作用点为环氧合酶。口服洛索洛芬钠时，以胃粘膜刺激作用较弱的未变化体状态，由消化道吸收，其后迅速变换成强力抑制前列腺素生物合成作用的活性代谢物trans-OH体（SRS配位）而发挥作用。适应症慢性风湿性关节炎，变形性关节炎，腰痛病，肩周炎，颈肩腕综合征；手术后、外伤后及拔牙后的镇痛消炎；急性上呼吸道炎症的解热镇痛。不良反应休克：因偶尔会发生休克，因此要仔细充分地观察，发现异常应停止给药，并进行适当处理。溶血性贫血：偶见溶血性贫血。皮肤-粘膜-眼综合征：因偶见皮肤-粘膜-眼综合征（Steven-Johnson综合征），因此要充分观察，发现异常应停止给药并采取适当措施。急性肾功能不全，肾病综合征：偶见急性肾功能不全或肾病综合征，应仔细观察，发现异常应停止给药，并进行适当处置。间质性肺炎：偶然出现伴有发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X线异常、嗜酸性粒细胞增多的间质性肺炎，出现上述症状时要停止给药，采取肾上腺皮质激素给药等适当处置。过敏：可见皮疹、瘙痒感。另外，偶尔会出现荨麻疹，出现这种症状时应停止给药。消化系统：偶尔会发生消化道溃疡，出现这种症状时应停止给药，另外有时会出现腹痛、胃部不适、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、便秘、烧心、消化不良、口腔炎。神经系统：有时会出现

现困倦，也可见头痛。血液：偶尔会出现贫血、白细胞减少、血小板减少，也可见嗜酸性粒细胞增多。肝脏：可见GOT、GPT、ALP的升高。其它：可见浮肿，偶见心悸。相互作用慎与香豆素类抗凝血药、磺酰脲类降血糖药、新喹诺酮类抗菌药及其它消炎镇痛药合用。用法用量成人60 mg/次，每日3次，或60-120 mg顿服。可根据年龄、症状作适当增减。注重事项假如长期给药的话，要定期进行临床检查（如尿液检查、血液学检查、肝功能检查），另外，发现异常要采取减量、停药等适当措施。用手术后及外伤时，要根据炎症、疼痛的程度而给药。原则上应避免长期使用同一种药物。充分观察患者的状态，注重发现副作用。因有可能掩盖感染症状，所以应用于因感染而引起的炎症时，要合用适当的抗菌药物，仔细观察，慎重给药。有消化性溃疡既往史的患者（有可能使溃疡再复发），血液学异常及有血液学异常既往史的患者（轻易引起溶血性贫血等副作用）。肝功能障碍及有既往史的患者（有可能使肝功能障碍恶化或复发）。有肾功能障碍及既往史的患者（有可能发生浮肿，蛋白尿，血清肌酐升高等副作用）。有心脏功能障碍、支气管哮喘、过敏既往史的患者慎用。对妊娠和哺乳的影响 妊娠期给药的安全性还没有明确，因此在对妊娠或可能妊娠的妇女进行治疗时，仅限于治疗有利性超过危险性时才给药。对儿童的影响 小儿给药的安全性还没有明确。对老年人的影响 老龄患者更轻易发生副作用，因此应从小量给药开始，并密切观察，慎重给药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com