

氯法齐明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_AF\\_E6\\_B3\\_95\\_E9\\_BD\\_90\\_E6\\_c22\\_310288.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_AF_E6_B3_95_E9_BD_90_E6_c22_310288.htm) 药品名称氯法齐明 英文名称Clofazimine 类别抗麻风病药性状棕红色或红褐色结晶或结晶性粉末；无臭。在氯仿中溶解，在乙醚中微溶，在乙醇中极微溶解，在水中不溶。制剂胶丸（油蜡或聚乙二醇基质）：每丸50mg。分子式成分药理及应用对麻风杆菌和其他的一些分支杆菌有抑菌作用。口服吸收不完全，吸收程度与药物粒度和剂型密切相关。吸收后，迅速进入各组织，在血流中浓度甚低，自组织中释放很慢，其消除半衰期约为70天。有约1%的药物由尿排出，有少量药物自汗腺、乳腺和皮脂腺排出。对于瘤型麻风和其他型麻风均有一定疗效，对耐砒类药物麻风杆菌感染也有效。虽然尚未发现对本品的耐药菌，但在一般情况下，应与氨苯砒联合应用。还可与利福平或乙硫异烟胺联合应用以制服耐砒类药物的菌。还对麻风反应有一定疗效，可用于因用其他药物而引起急性麻风反应的病例。此外，尚对慢性盘状红斑狼疮、掌脓疱角化病、皮肤溃疡，坏疽性脓皮病也有一定疗效。用法用量口服。对麻风病，每日100mg；对麻风反应，1日200～400mg，麻风反应控制后，逐渐减量至每日100mg。注重事项（1）本品蓄积于皮肤及角膜，可显红色或棕色，并使尿、痰、汗液显红色，少数病人并可发生光敏反应。（2）可发生恶心、呕吐和腹泻症状，与剂量大小密切相关。（3）本品可通过胎盘与进入乳汁，使新生儿和哺乳儿皮肤染色。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)