

氨苯吩嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A8\\_E8\\_8B\\_AF\\_E5\\_90\\_A9\\_E5\\_c22\\_310308.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_A8_E8_8B_AF_E5_90_A9_E5_c22_310308.htm) 药品名称氨苯吩嗪  
英文名称Clofazimine 类别抗麻风病药药理毒理属二线抗麻风药  
适应症治疗瘤型麻风和界线类麻风，适用于对砒类药物过敏者或细菌对砒类耐药时，能控制反复发作。不良反应1 有轻度至中度消化道反应，如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。偶见皮肤瘙痒、头晕等。2 本品可使皮肤红染，皮损部位可发生棕黑色变化，停药后色素尚可存在数月。尿、汗、痰液也可不同程度染色。相互作用本品不易引起麻风反应，故能在其他药物引起麻风反应不能继续用药时使用。用法用量第1~2周，隔日服用100mg(顿服)；第3~4周，每日服100mg，服6天停1天；以后剂量可增到每日200mg，服6天停1天。控制麻风反应，开始用每日300mg，待反应控制后逐渐减到每日100mg(维持量)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)