

制霉菌素片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_88_B6_E9_9C_89_E8_8F_8C_E7_c22_310326.htm 药品名称制霉菌素片
药物别名米可定 Mycostatin，Fungicide 英文名称Nystatin 类别四环素类制剂片剂：10万U、25万U、50万U。药理毒理多烯类抗真菌药，具广谱抗真菌作用，对念珠菌属的抗菌活性高，新型隐球菌、曲霉、毛霉菌、小孢子菌、荚膜组织浆胞菌、皮炎芽生菌及皮肤癣菌通常对本品亦敏感。本品可与真菌细胞膜上的甾醇相结合，致细胞膜通透性的改变，以致重要细胞内容物漏失而发挥抗真菌作用。药动学本品口服后胃肠道不吸收，给常用口服量后血药浓度极低，对全身真菌感染无治疗作用。几乎全部服药量自粪便内排出。局部外用亦不被皮肤和粘膜吸收。适应症口服治疗消化道念珠菌肠炎；局部应用治疗口腔念珠菌感染、皮肤粘膜念珠菌感染。阴道念珠菌病。不良反应口服后可发生恶心、呕吐、腹泻等。减量或停药后迅速消失。局部应用后可能引起过敏性接触性皮炎。个别患者阴道应用后可引起白带增多。用法用量口服，成人200万~400万U/日，分4次；儿童5万~10万U/次，3~4次/日。消化道念珠菌病：口服，成人一次50~100万单位，一日3次；小儿每日按体重5~10万单位/kg，分3~4次服。注意事项有制霉菌素过敏史者禁用。妊娠B类。混悬液剂室温下不稳定，应新鲜配制。本品口服除念珠菌肠炎外，不宜用作其它深部真菌病的治疗。本品对全身真菌感染无治疗作用。孕妇及哺乳期妇女慎用。5岁以下儿童不推荐使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com