

头孢替安酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_9B_BF_E5_c22_310379.htm 药品名称头孢替安酯
药物别名Pansporin、CTM-HE 英文名称Cefotiam Hexetil 类别
四代头孢制剂片剂：每片100mg；200mg。药理毒理本品系
注射用头孢替安乙酯化而成的口服抗生素。本品自身并无抗
菌作用，是口服后在肠道粘膜迅速水解为头孢替安(CTM)而
被吸收。CTM对革兰阳性和阴性菌的抗菌活性与以往口服的
头孢菌素相同，而且对β-内酰胺酶稳定。本品对临床分离的
金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、肺炎链球菌、淋球
菌、耐氨苄西林淋球菌(ABPC)、卡他莫拉菌、大肠杆菌、
枸橼酸菌属、普罗威登斯菌属、化脓性链球菌、无乳链球菌
、肺炎克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、流行性感嗜血杆菌，
均有较强的抗菌活性，MIC比头孢氨苄、头孢克罗低。药动
学饭后1次口服本品100mg、200mg或400mg，血中CTM浓度迅
速上升，而且随药量增加而升高。其C_{max}为1.54mg/L
、2.73mg/L、4.55mg/L。血浆蛋白结合率为8%。本品在痰
、耳漏液、鼻涕、上颌窦粘膜、扁桃体、皮肤、胆汁中转运
良好。24h尿排泄率为40%。用餐对本品吸收影响很小。适应
症敏感菌引起的下述感染：咽喉炎、急性支气管炎、扁桃
体炎、肺炎、肾盂肾炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎、脓性
疮、疔肿、丹毒、肛周脓肿、乳腺炎、眼部感染、中耳
炎、鼻窦炎等。不良反应发生率约为3.6%，主要有腹
泻或软便、呕吐、腹痛、皮疹。实验室检查异常占4.3%，
有嗜酸粒细胞增多、ALT及AST升高，停药后即迅速改善。
用法用量成人一般剂量每次200~400mg，每日3次。100Test
下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com