

阿奇霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_98_BF_E5_A5_87_E9_9C_89_E7_c22_310383.htm 药品名称阿奇霉素药物别名阿红霉素，阿齐红霉素 英文名称Azitromycin〔 〕类别大环内酯类制剂胶囊：每粒250mg或500mg。分子式成分药理及应用本品的抗菌谱与红霉素相近，作用较强，对流感嗜血杆菌、淋球菌的作用比红霉素强4倍；对军团菌强2倍；对绝大多数革兰阴性菌的MIC < 1 μg / ml，对梭状芽胞杆菌的作用也比红霉素强，在应用于金黄色葡萄球菌感染中也比红霉素有效。此外，本品对弓形体（Toxoplasma）、梅毒螺旋体也有良好的杀灭作用。本品的口服生物利用度约为40%，分布容积为23L / kg，消除率为10ml / (minkg)，半衰期约41小时，体内的血浓度高于红霉素。临床应用于敏感微生物所致的呼吸道、皮肤和软组织感染。用法用量每日只需服1次，成人500mg；儿童10mg / kg，连用3日。注重事项（1）对大环内酯类药物过敏者禁用。肝功能不全者、孕妇和哺乳妇均需慎用。（2）本品的总不良反应率约为12%，消化道反应（包括呕吐、腹泻、腹痛等）约9.6%；神经系统反应1.3%；皮疹 < 1%；ALT和AST升高分别为1.7%和1.5%；少数患者出现白细胞计数减少。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com