

琥乙红霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_90_A5_E4_B9_99_E7_BA_A2_E9_c22_310390.htm 药品名称琥乙红霉素
英文名称Ethylsuccinate 类别大环内酯类性状白色结晶性粉末
；无臭，无味。在无水乙醇、丙酮或氯仿中易溶，在乙醚中
略溶，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片0.1g；0.125g（按红
霉素计）。颗粒剂：每包0.05g；0.1g；0.125g，0.25g（按红霉
素计）。药理及应用在体内水解，释放出红霉素而起抗菌作
用。因无味，且在胃液中稳定，故可制成不同的口服剂型，
供儿童和成人应用。适应证与红霉素同。用法用量口服：成
人，1次0.25～0.5g，1日3～4次。小儿，1日量30～40mg/kg，
分3～4次用；或按下列方案应用。体重<5kg者，1日40mg
/kg；5～7kg者，1次50mg，1日4次；7～11kg者，1次100mg
，1日4次；11～23kg者，1次200mg，1日4次；23～45kg者，1
次300mg，1日4次；>45kg者，按成人量。注重事项（1）本
品的肝毒性虽较无味红霉素为低，但由于体内红霉素是经肝
代谢和排泄的，故肝功能不全者仍应慎用。（2）红霉素可
透过胎盘和进入乳汁，虽毒性不大，但在妊娠期与哺乳期内
均应慎用。（3）食物对本品的吸收影响不大，故可食后（
或食前）服用。（4）其他参见红霉素。100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com